


Фіксація побічних реакцій при лікуванні випадків ТБ

Важливо, щоб лікарі фіксували побічні реакції препаратів при лікуванні випадків туберкульозу. Це допоможе лікарям краще розуміти, як лікувати пацієнтів, і уникати небажаних наслідків. Для цього потрібно використовувати спеціальні форми, які надає Міністерство охорони здоров'я України. Ці форми можна знайти на сайті МОЗ України в розділі «Лікування туберкульозу».



Важливо, щоб лікарі фіксували побічні реакції препаратів при лікуванні випадків туберкульозу.

Наявність побічної реакції [†]	Побічні реакції особливого інтересу
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	підвищення печінкових ферментів
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	мієлосупресія
<input checked="" type="checkbox"/>	мієлосупресія
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	гепатит
<input checked="" type="checkbox"/>	гепатит
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	гепатит
<input checked="" type="checkbox"/>	