

Помилково встановили не той клінічний діагноз. Чи можна змінити?

Клінічна стадія III. Важкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит або остеомієліт, бактеріємія, важкі запальні захворювання малого таза та ін.)

????????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????,
????????????? "????????? ???".

? ????? "????????? ??????????" ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????,
????????????? "????????????".

??????! ?????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????? ??????????
????????????????? ??????????????.

????? ? ?????????? ?????????? ??????????, ?? ?????? ?????????????????????? ??
????????????? ?????????? "?????????" ? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????????.

Основний діагноз ВІЛ

Дата встановлення*02.06.2023

Опис діагнозуВІЛ-інфекція I клінічна стадія. Безсимптомний перебіг

1

Клінічний діагноз*ВІЛ-асоційована енцефалопатія

Імунологічна стадія

СтадіяКлінічна стадія IV

МКХ-10B22.0 - Хвороба, зумовлена ВІЛ, з проявами енцефалопатії

Статус за діагнозомЗаключний

ВидалитиДодатиСкасуватиПідтвердитиСкасувати підтвердження

Статус хворого ВІЛ

Перебіг хвороби

ТБ статусТБ – потребує профілактики ТБ

ВГ статусГ2 – не інфікований вірусним гепатитом В та С

Функціональний статусР – фізична активність не обмежена, здатний до виконання регулярної праці та повсякденної діяльн

Статус СІНС1 – заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом

2

Прихильність

ІсторіяЛікуванняСайт МКХ-10ЗберегтиСкасуватиДалі

Версія #5

Створено 31 серпень 2023 12:35:25

Оновлено 10 грудень 2024 13:08:44