

Помилково встановили не той клінічний діагноз. Чи можна змінити?

Клінічна стадія III. Важкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит або остеомієліт, бактеріємія, важкі запальні захворювання малого таза та ін.)

????????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????,
????????????? "????????? ???".

? ????? "????????? ??????????" ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????,
????????????? "????????????".

?????! ?????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????? ??????????
????????????????? ?????????????.

????? ? ?????????? ?????????? ??????????, ?? ?????? ?????????????????????? ??
????????????? ?????????? "?????????" ? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????????.

Основний діагноз ВІЛ

Дата встановлення*

02.06.2023

Опис діагнозу

ВІЛ-інфекція I клінічна стадія. Безсимптомний перебіг

Клінічний діагноз*

ВІЛ-асоційована енцефалопатія

Імунологічна стадія

Стадія

Клінічна стадія IV

МКХ-10

B22.0 - Хвороба, зумовлена ВІЛ, з проявами енцефалопатії

Статус за діагнозом

Заключний

[Видалити](#) [Додати](#) [Скасувати](#) [Підтвердити](#) [Скасувати підтвердження](#)

Статус хворого ВІЛ

Перебіг хвороби

ТБ статус

Т6 – потребує профілактики ТБ

ВГ статус

Г2 – не інфікований вірусним гепатитом В та С

Функціональний статус

Р – фізична активність не обмежена, здатний до виконання регулярної праці та повсякденної діяльн

Статус СІН

С1 – заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом

Прихильність

Історія

Лікування

Сайт МКХ-10

Зберегти

Скасувати

Далі

Версія #5

Створено 31 серпень 2023 12:35:25

Оновлено 10 грудень 2024 13:08:44