

Визначення рівня депресії

Обрати пункт “Визначення рівня депресії” та натиснути кнопку “Створити”:

Медичні документи | Прийом препаратів | Ключова інформація пацієнта | Епізоди | Плани лікування

Основне

Результати досліджень
(Швидкі тести (ПАР, гепатити))
Контроль за ціловим використанням препаратів
Порушення правил участі у програмі
Визначення рівня депресії
Імунізація

Консультація нарколога від 21.09.2022

Антропометрія
Направлення
Діагноз за спеціальністю
Стаж вживання психоактивних речовин
План лікування
Результати досліджень
(Швидкі тести (ПАР, гепатити))
Контроль за ціловим використанням препаратів
Порушення правил участі у програмі

Визначення рівня депресії

Номер | Дата | Спеціаліст

Додати

Сторінка № 1 із 0 | Усього рядків 0

Заповнити відповіді на запропоновані питання та натиснути Зберегти:

Основне

Спеціаліст Тарасова Світлана В'ячеславівна | Дата 07.10.2022

Як часто за останні 2 тижні Вас турбували наступні прояви?

Дуже низька зацікавленість або задоволення від звичайних справ (відсутність бажання щось робити)

Поганий настрій, пригніченість або почуття безпорадності

Труднощі із засинанням, переривчастий або занадто тривалий сон

Почуття втоми або знесилення (занепад сил)

Поганий апетит чи навпаки – переїдання

Погані (негативні) думки про себе. Ви вважаєте себе невдахою або розчаровані в собі, або вважаєте, що не виправдали сподівань своєї родини

Труднощі концентрації уваги (наприклад, зосередитися на читанні газети чи перегляді телепередач)

Ваші рухи або мова були настільки повільними, що оточуючі могли це помітити. Або, навпаки, Ви були настільки метушливі або збуджені, що рухалися більше, ніж зазвичай

Думки про те, що Вам краще було б померти або про те, щоб заподіяти собі шкоди будь-яким чином

У випадку наявності у Вас наведених вище проблем – наскільки вони ускладнили виконання Вами службових обов'язків, домашніх справ або ж спілкування з іншими людьми?

Загальний бал 0 | Тяжкість депресії: Депресія відсутня

Зберегти | Скасувати | Далі

В залежності від відповідей буде автоматично розраховано рівень депресії пацієнта:

Як часто за останні 2 тижні Вас турбували наступні прояви?

Дуже низька зацікавленість або задоволення від звичайних справ (відсутність бажання щось робити)

Більше половини цього часу

Поганий настрій, пригніченість або почуття безпорадності

Майже кожного дня

Труднощі із засинанням, переривчастий або занадто тривалий сон

Не турбували взагалі

Почуття втоми або знесилення (занепад сил)

Майже кожного дня

Поганий апетит чи навпаки – переїдання

Майже кожного дня

Погані (негативні) думки про себе. Ви вважаєте себе невдахою або розчаровані в собі, або вважаєте, що не виправдали сподівань своєї родини

Майже кожного дня

Труднощі концентрації уваги (наприклад, зосередитися на читанні газети чи перегляді телепередач)

Більше половини цього часу

Ваші рухи або мова були настільки повільними, що оточуючі могли це помітити. Або, навпаки, Ви були настільки метушливі або збуджені, що рухалися більше, ніж зазвичай

Не турбували взагалі

Думки про те, що Вам краще було б померти або про те, щоб заподіяти собі шкоди будь-яким чином

Не турбували взагалі

У випадку наявності у Вас наведених вище проблем – наскільки вони ускладнили виконання Вами службових обов'язків, домашніх справ або ж спілкування з іншими людьми?

Надзвичайно ускладнили

Загальний бал 16

Тяжкість депресії: **Середньої тяжкості депресія**

Версія #1

Національний адміністратор створив 20 жовтень 2022 10:43:53

Національний адміністратор оновив 14 липень 2023 08:35:22